

NHẬN XÉT BIỂU HIỆN HOANG TƯỞNG VÀ ẢO GIÁC Ở BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT

PHẠM ĐỨC THỊNH và CS
Viện giám định pháp y tâm thần TW

TÓM TẮT

trị nội trú cho thấy hoang tưởng bị hại 51,45%, hoang tưởng bị chi phối 11,56%; ảo thanh bình phẩm 34,68%, ảo thanh ra lệnh 19,08%.

Từ khoá: Tâm thần phân liệt, hoang tưởng, ảo giác.

SUMMARY

Study 173 patients schizophrenics of hospitalization that had done delusion of persecution 51.45%, delusion of control 11.56%; Verbal hallucination of discussion 34.68%; verbal hallucination of demand 19.08%.

Key words: Schizophrenia, delusion, hallucination.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Tâm thần phân liệt (Schizophrenia) là một bệnh loạn thần nặng, khá phổ biến. Biểu hiện lâm sàng của bệnh rất đa dạng, phức tạp, chủ yếu là các rối loạn tư duy (hoang tưởng), rối loạn tri giác (ảo giác). Bệnh chỉ ổn định nếu được điều trị đúng và kịp thời bằng hoá dược.

Ở Việt Nam, trong những thập niên gần đây đã có một số nghiên cứu ở bệnh nhân tâm thần phân liệt, song chưa hệ thống. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài: "Nhận xét biểu hiện hoang tưởng và ảo giác ở bệnh nhân tâm thần phân liệt" nhằm mục tiêu:

Phân tích đặc điểm hoang tưởng và ảo giác ở bệnh nhân tâm thần phân liệt điều trị nội trú.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu.

Chọn ngẫu nhiên 173 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là tâm thần phân liệt đáp ứng tiêu chuẩn của ICD-10 (1992). Các bệnh nhân đang được điều trị nội trú tại Khoa Tâm thần, Bệnh viện 103 và Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2005.

2. Phương pháp nghiên cứu.

Theo phương pháp tiến cứu, mô tả lâm sàng từng trường hợp.

3. Xử lý số liệu.

Theo phương pháp thống kê y học.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

Bảng 1. Rối loạn nội dung tư duy ở bệnh nhân tâm thần phân liệt.

STT	Bệnh nhân nghiên cứu Các hoang tưởng	n=173	Tỷ lệ (%)	P
1	HT bị theo dõi	6	3,47	P>0,05
2	HT bị chi phối	20	11,56	
3	HT bị hai	89	51,45	P< 0,001
4	HT ghen tuông	12	6,94	
5	HT liên hệ	3	1,73	
6	HT tự cao	21	12,14	P>0,05
7	HT khác	11	6,36	

Trên bảng 1, chúng tôi thấy hoang tưởng bị hại gấp nhiều nhất (chiếm 51,45%), có ý nghĩa thống kê với P<0,001. Phù hợp với tác giả Kepbicop O.V, Nguyễn Kim Việt và Kaplan H.I.

Bảng 2. Đặc điểm ảo giác ở bệnh nhân tâm thần phân liệt

STT	Bệnh nhân nghiên cứu Loại ảo giác	n=173	Tỷ lệ (%)	P
1	Ảo thanh bình phẩm	60	34,68	$P_{6-1}<0,001$
2	Ảo thanh đám thoại	15	8,67	$P_{1-2}<0,01$
3	Ảo thanh ra lệnh	33	19,08	
4	Ảo thị	7	4,05	
5	Ảo giác nội tang	1	0,58	
6	Ảo giác khác	4	2,31	$P>0,05$

Ở bảng 2, chúng tôi thấy ảo thanh bình phẩm chiếm 34,68%, cao hơn các loại ảo giác khác, có ý nghĩa thống kê với $P<0,001$. Phù hợp với nghiên cứu của các tác giả khác.

KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu 173 bệnh nhân tâm thần phân liệt điều trị nội trú trên, chúng tôi thấy:

Đặc điểm hoang tưởng và ảo giác:

- Ảo thanh bình phẩm chiếm 34,68%; ảo thanh ra lệnh 19,08%.

- Hoang tưởng bị hại chiếm tỷ lệ cao nhất 51,45%; tiếp đến là hoang tưởng tự cao 12,14; hoang tưởng bị chi phối 11,56%.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Kaplan H. I, Sadock B. J, Grebb J. A (1994) "Schizophrenia", Synopsis of Psychiatry, Behavioral Science, Clinical Psychiatry, Sydney, trang 457-485.

2. Kepbicôp O.V, Cockina M.V, Natgiaroop.R.A, Xnhegiohepxki A.V (1980), "Bệnh tâm thần phân liệt", Tâm thần học, trang 242-263.

3. Johns LC, Van Os J (2001) "The continuity of psychotic experiences in the general population", Clin Psychol Rev. 2001 Nov; 21(8):1125-1141.

4. Nguyễn Việt (1984) "Bệnh tâm thần phân liệt", Tâm thần học, NXB Y học – Hà Nội, trang 123-132.

5. Nguyễn Kim Việt (2000) "Vấn đề tái phát và phòng tái phát bệnh tâm thần phân liệt", Nội san Tâm thần học, số 3, Hội tâm thần học Hà Nội, trang 34-38.